

PHÒNG CHỐNG BỆNH DỊCH TẢ HEO CHÂU PHI




• Dịch tả heo Châu Phi là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do vi rút gây ra; lây lan nhanh qua tiếp xúc trực tiếp mầm bệnh và xảy ra ở mọi lứa tuổi, mọi loại heo.

• Bệnh không lây lan trên người nhưng gây thiệt hại nghiêm trọng về kinh tế với tỷ lệ chết trên heo cao (lên đến 100%).


• Heo khởi bệnh vẫn có thể mang trùng và truyền lây bệnh suốt đời.

• Thời gian ủ bệnh 4 - 19 ngày, ở thể cấp tính thời gian ủ bệnh chỉ từ 3 - 4 ngày. Vi rút có sức đề kháng cao với môi trường, tồn tại thời gian dài trong thịt đông lạnh (1.000 ngày), giảm băng (140 ngày). Vi rút có thể bị tiêu diệt ở nhiệt độ 70oC, thời gian 30 phút trong thịt nấu chín (nguồn FAO).

• Hiện nay chưa có vắc xin và thuốc điều trị bệnh Dịch tả heo châu Phi, vì vậy giải pháp phòng bệnh bằng các biện pháp an toàn sinh học là chính.



Heo sốt, thân nhiệt cao hơn 40⁰C; Heo không ăn, nôn mửa, ủ rũ, lưỡi vận động, nằm chõng đống; có thể hôn mê.



Heo có biểu hiện đau vùng bụng. Vàng tai, đuôi, cẳng chân, da phần dưới ngực và bụng... có thể có màu đỏ, sẫm, xanh tím.



Heo chết đột ngột; lá lách sưng to màu đen do nhồi huyết; phủ tạng (tim, phổi, ruột, thận,...) xuất huyết.

CHI CỤC CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y TỈNH ĐỒNG NAI

Địa chỉ: Đường Đồng Khởi, P. Tam hòa,

TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai.


Điện thoại: 02513.895290 - 02513.857420

Fax: 02513.857421


Website: chicucthuynai.gov.vn

ĐƯỜNG TRUYỀN LÂY

► Vi rút truyền lây qua chất tiết, dịch tiết, chất thải, xác động vật, thịt heo và các chế phẩm từ thịt heo như xúc xích, giăm bông,...



Con người và phương tiện vận chuyển là 2 yếu tố quan trọng làm lây lan bệnh trên diện rộng.



Không mua gia súc không rõ nguồn gốc về nuôi;
Không nuôi động vật khác như: Gà, vịt, chó mèo... trong khu vực nuôi; Không sử dụng thức ăn thừa (có chứa thịt heo) để nuôi heo.

PHÒNG CHỐNG BỆNH



Đặt khay khử trùng tại đầu các dây chuồng nuôi; Yêu cầu chủ phương tiện vận chuyển phải vệ sinh, tiêu độc khử trùng trước khi vào cổng trại.



Tiêu độc khử trùng ít nhất 2 lần/tuần; Thuốc có thành phần iốt tác dụng sát trùng hiệu quả.



Không cho người lạ vào khu vực chăn nuôi.
Công nhân thay quần áo khi ra khỏi trại.
Khi phải cho người khác vào khu vực chăn nuôi phải thực hiện quy trình vệ sinh, sát trùng người, dụng cụ và phương tiện trước và sau khi ra vào.

PHÒNG CHỐNG BỆNH

- ♣ Người tiêu dùng chỉ mua sản phẩm thịt heo có nguồn gốc rõ ràng;
- ♠ Không chế biến thịt gần khu vực chuồng nuôi.

Thực hiện 5 không:

1. Không giầu dịch;
2. Không mua bán vận chuyển heo bệnh, heo chết;
3. Không giết mổ, tiêu thụ thịt heo bệnh, thịt heo chết;
4. Không vứt heo chết ra môi trường;
5. Không sử dụng thức ăn dư thừa nuôi heo mà không qua xử lý nhiệt.

Khi phát hiện có heo bệnh, chết phải cách ly và báo ngay cho chính quyền địa phương, cơ quan thú y. Không bán chạy heo bệnh hoặc vứt xác ra môi trường làm lây lan dịch bệnh.

Số điện thoại liên hệ:

1. Trạm CNTY Biên Hòa: 02513.822.817
2. Trạm CNTY Trảng Bom: 02513.866.171
3. Trạm CNTY Thống Nhất: 02513.678.509
4. Trạm CNTY Định Quán: 02513.851.197
5. Trạm CNTY Tân Phú: 02513.856.536
6. Trạm CNTY Vĩnh Cửu: 02513.865.026
7. Trạm CNTY Long Khánh: 02513.725.012
8. Trạm CNTY Xuân Lộc: 02513.871.125
9. Trạm CNTY Cẩm Mỹ: 0251.3878.760
10. Trạm CNTY Long Thành: 02513.844.102
11. Trạm CNTY Nhơn Trạch: 02513.521.448